

# Lafi

## ENTERO

### Comprimidos solubles

#### USO VETERINARIO

#### COMPOSICIÓN Por comprimido (700mg):

Sulfaquinoxalina sódica ..... 250 mg  
Excipiente c.s.

#### INDICACIONES:

Tratamiento preventivo y curativo de la coccidiosis intestinal y cecal de las aves, así como la coccidiosis hepática de los conejos, producidas por las siguientes especies:

- Pollos: *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. mitis*,  
*E. hagani*, *E. praecox*...
- Pavos: *E. maleagris*, *E. adenoides*, *E. gallopavonis*...
- Conejos: *E. maleagris*, *E. perforans*, *E. magna*, *E. irrisidua*...

#### ESPECIES DE DESTINO:

Aves y conejos.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral en el agua de bebida o en el pienso.

#### POSOLÓGIA:

La medicación será general, a todo el efectivo, desde la aparición de los primeros síntomas.

- Aves. **Preventivo:** 1 comprimido cada 2 kg. de pienso ó un comprimido cada 4 litros de agua de bebida, en las primeras 8 semanas de vida.  
**Curativo:** 1,5 comprimidos por cada litro de agua durante tres días. Descansar durante dos días y repetir la misma dosis durante otros tres días.
- Conejos. **Preventivo:** 1 comprimido por litro de agua bebida, durante tres días o bien un comprimido cada 2,5 litros durante 15 días.  
**Curativo:** 4 comprimidos por litro de agua bebida durante 7 días. Continuar con 1 comprimido cada 2,5 litros durante dos semanas.

#### CONTRAINDICACIONES:

Animales con procesos hemorrágicos, alteraciones hepáticas o renales. No administrar a conejas gestantes ni gallinas cuyos huevos se destinen a consumo humano. Animales con hipersensibilidad a las sulfamidas.

**INTERACCIONES:**

Debe evitarse la administración simultánea, de antibióticos bactericidas y de anestésicos locales como la procaína y en general sustancias que aporten o liberen PABA.

**RECOMENDACIONES:**

Asegurarse que los animales tienen libre acceso al agua bebida, sobre todo en épocas cálidas.

**EFECTOS SECUNDARIOS:**

En tratamientos prolongados (superiores a 5 días) pueden darse hemorragias agudas en algunos pollos tratados sobre todo en las épocas cálidas del año. En estos casos se requiere una suplementación extra de vitamina K.

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

En caso de sobredosificación pueden presentarse hemorragias que se resuelven con la supresión del tratamiento y la administración de hepatoprotectores y vitamina K.

También pueden aparecer diarreas y cristaluria, que desaparecen con la interrupción de la medicación y el tratamiento sintomático (alcalinizar la orina).

**CONSERVACIÓN:**

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

El agua de bebida medicada es de consumo inmediato.

**PERÍODO DE SUPRESIÓN:**

Carne: 21 días

Huevos: No administrar a hembras cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**PRESENTACIÓN:**

Envases de 20 y 1.000 comprimidos.

N.º Registro: 456/0418 ESP

**LABORATORIOS LAFI, S. A. L. Carretera Nacional 152, Km 24 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona)**

4-09-03